ADVION GEL ANT

Indoxacarb Gel-Köder | Ameisenbekämpfung

ECOTOX

PRODUKTÜBERSICHT	
Produkttyp	Gel-Köder (gebrauchsfertig)
Wirkstoff	Indoxacarb 0,05 % (Oxadiazin)
Wirkung	Magenköder, Weiterverbreitung im Nest (Dominoeffekt)
Innen/Aussen	Innen und Aussen
Hersteller	Syngenta Agro AG, Stein AG

ZIELSCHÄDLINGE

- Ameisen (alle gängigen Haushaltsarten)
- Wegameisen, Pharaoameisen, Rasenameisen

GEEIGNETE EINSATZORTE

- Hinter Sockelleisten, in Ritzen und Fugen
- Küchen, Bäder, Lagerbereiche (abseits von Lebensmitteln)
- Eingänge, Laufwege entlang von Wänden
- Aussenanwendung entlang Gebäudefundamenten

VERBOTENE / UNGEEIGNETE EINSATZORTE

- Nicht direkt auf Lebensmittel oder Lebensmittelflächen
- Nicht in Kontakt mit Wasserläufen oder Kanalisation
- Nicht in freiliegenden Bereichen, wo Haustiere direkt Kontakt haben

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

✓ **Schutzhandschuhe (Latex/Nitril) empfohlen**
✓ **Kein Atemschutz erforderlich bei Normalanwendung**
✓ **Hände nach Arbeit waschen**

ERSTE HILFE

- Einatmen: Keine Massnahmen erforderlich (nicht klassifiziert)
- Hautkontakt: Mit Seife und Wasser waschen
- Augenkontakt: Mit Wasser spülen, bei Reizung Arzt
- Verschlucken: Wasser trinken, Arzt konsultieren; Tox Info: 145

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Ziel	Menge	Hinweise
Laufwege	0,1–0,5 g	Kleine Gelspots alle 10–30 cm
Ameisenstrassen	Alle 20 cm	Punkte direkt auf Laufwege setzen
Nesteingang	0,5–1 g	Möglichst nah am Eingang platzieren

Gel in kleine Punkte (Reiskorn-Grösse) auftragen. Gel NICHT wegwischen – Ameisen müssen Köder tragen können!

KRITISCHE WARNUNGEN

⚠ **Gel nicht direkt neben Insektizidsprays verwenden (Kontamination tötet Ameisen zu schnell!)**
⚠ **Köder nie mit Reinigungsmitteln in Kontakt bringen (Repellent-Effekt)**
⚠ **Kein direkter Kontakt mit offenen Lebensmitteln**

HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN

✗ Falsch	✓ Richtig
Grosse Mengen auf einmal auftragen	Kleine Punkte setzen – Ameisen selektieren frisches Gel
Köder mit Spray kombinieren	Insektizid-Sprays vor dem Köder einstellen!
Köder wegwischen nach 1 Tag	Mind. 3–5 Tage stehen lassen – Dominoeffekt braucht Zeit
Köder an unsichtbarer Stelle platzieren	Auf Laufwegen platzieren wo Ameisen aktiv sind

TIPPS FÜR TECHNIKER

- Gel alle 3–5 Tage erneuern bis Befall vollständig eliminiert
- Laufwege identifizieren – Köder direkt auf aktive Strecken setzen
- Ziel ist Dominoeffekt: Ameisen tragen Köder ins Nest zurück
- Kombination mit Köderstation für hygienischere Anwendung
- Bei Pharaoameisen: Grosse Fläche behandeln, mehrere Nester möglich