

PRODUKTÜBERSICHT

Produkttyp	Mikroverkapseltes Insektizid-Konzentrat (zum Verdünnen)
Wirkstoff	Cyphenothrin 100 g/L + Prallethrin 10 g/L
Wirkung	Kontakt- und Frasskörper, Schock- + Langzeitwirkung bis 12 Wochen
Innen/Aussen	Innen und Aussen / Landwirtschaft
Vertrieb	Paradiffusion SA, Versoix / AMM: CHZN-7252

ZIELSCHÄDLINGE

- Fliegen, Mücken, Stechmücken, Trauermücken
- Schaben, Ameisen, Bettwanzen
- Wespen, Hornissen
- Milben, Käfer (Tenebrionen), Flöhe

GEEIGNETE EINSATZORTE

- Innenräume: Lager, Keller, Gastronomie, Stallungen
- Aussenbereich: Fassaden, Eingänge, Terrassen
- Agrarindustrie und Lebensmittelbetriebe (nach Zulassung)
- Hohlräume und Zwischenwände

VERBOTENE / UNGEEIGNETE EINSATZORTE

- Nicht in Gewässernähe (Pyrethroide – aquatisch giftig)
- Nicht auf blühenden Pflanzen (giftig für Bienen)
- Nicht auf Lebensmittelkontaktflächen (direkt)
- Nicht in Räumen mit Katzen (Pyrethroid-Toxizität)

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

- ✓ **Schutzhandschuhe (Gummi/Nitril) – Pflicht**
- ✓ **Schutzbrille bei Sprühanwendung**
- ✓ **Atemschutz P2 bei Grossflächenbehandlung**
- ✓ **Langärmlige Kleidung, Hände nach Arbeit waschen**

ERSTE HILFE

- Einatmen: Frischluft; bei Symptomen Arzt aufsuchen
- Hautkontakt: Mit Seife und Wasser waschen
- Augenkontakt: 15 Min. spülen, bei Reizung Arzt
- Verschlucken: Nicht erbrechen; Tox Info Suisse: 145

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Ziel	Menge	Hinweise
Fliegende Insekten	35 ml/5 L	Auf 100 m² sprühen (50 ml/m²)
Kriechende Insekten	50 ml/5 L	Auf 100 m² sprühen (50 ml/m²)
Wirkdauer	–	Bis 12 Wochen (auf geeigneten Flächen)

Konzentrat in Wasser verdünnen. Vor Anwendung gut schütteln. Mikrokapseln haften auf Oberflächen und setzen Wirkstoff konstant frei.

KRITISCHE WARNUNGEN

- ⚠ **Pyrethroide – HOCHGIFTIG FÜR KATZEN (auch nach Trocknung Risiko)!**
- ⚠ **Sehr giftig für Bienen – nicht auf oder in Blütenbereich sprühen**
- ⚠ **Gefährlich für Fische und Wasserorganismen – Abflüsse fernhalten**
- ⚠ **Schockwirkung + lange Residualwirkung – nicht überdosieren!**

HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN

✗ Falsch	✓ Richtig
Auf Blüten oder Bienenhabitate sprühen	Anwendung erst nach Bienenflugzeit oder abends
Katzen-Zugang nicht sperren	Behandelte Bereiche bis vollständige Trocknung sperren
Produkt unverdünnt verwenden	Immer gemäss Etikette verdünnen – 35 oder 50 ml/5 L
Nahe Gewässer oder Abflüsse sprühen	Abstand zu Abflüssen und Gewässern einhalten

TIPPS FÜR TECHNIKER

- Mikrokapseln setzen Wirkstoff konstant frei – kein Über-Auftragen nötig
- Wirkdauer bis 90 Tage auf geeigneten Oberflächen – regelmässig prüfen
- Prallethrin = Schnellkill; Cyphenothrin = Langzeitwirkung
- Gut lüften nach Innenanwendung – Aerosol setzen lassen
- Behälter vor Gebrauch immer gut schütteln (Kapseln absetzen)