

PRODUKTÜBERSICHT

Produkttyp	Gel-Köder (gebrauchsfertig, PT18)
Wirkstoff	Imidacloprid 0,0204 % (Neonicotinoid)
Wirkung	Magenköder, systemisch, Dominoeffekt im Nest
Innen/Aussen	Innen und Aussen
Hersteller/Lieferant	Detia Freyberg GmbH / PESTEX, Goldau

ZIELSCHÄDLINGE

- Ameisen: Wegameisen, Pharaoameisen, Gartenameisen
- Verschiedene Ameisenarten im Innen- und Aussenbereich

GEEIGNETE EINSATZORTE

- Hinter Sockelleisten, in Ritzen und Fugen
- Küchen, Bäder, Terrassenbereich
- Entlang von Ameisenwegen und Laufpfaden
- Nahe Nestausgängen im Aussenbereich

VERBOTENE / UNGEEIGNETE EINSATZORTE

- Nicht in Gewässernähe: Imidacloprid ist hochgiftig für Wasserorganismen (H411)!
- Nicht auf Blühpflanzen (Imidacloprid ist bienentoxisch)!
- Nicht auf Lebensmittelkontaktflächen direkt
- Kein Einsatz in Kombination mit Insektizidsprays

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

- ✓ **Schutzhandschuhe (Latex/Nitril) empfohlen**
- ✓ **Kein Atemschutz erforderlich bei Normalanwendung**
- ✓ **Hände nach Arbeit waschen**

ERSTE HILFE

- Einatmen: Frischluft; bei Symptomen Arzt
- Hautkontakt: Mit Seife und Wasser waschen
- Augenkontakt: Mit Wasser spülen; bei Reizung Arzt
- Verschlucken: Wasser trinken; Arzt konsultieren; Tox Info: 145

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Ziel	Menge	Hinweise
Laufwege	0,1–0,3 g	Kleine Gelspots alle 10–20 cm
Nesteingang	0,5 g	Möglichst nah am Eingang setzen
Aussenbereich	Alle 20 cm	Entlang Fundament und Ameisenpfaden

Kleine Gelspots auftragen. Gel NICHT entfernen oder wegwischen – Ameisen müssen Köder ins Nest tragen!

KRITISCHE WARNUNGEN

- ⚠ **IMIDACLOPRID – HOCHGIFTIG FÜR BIENEN (H411) – nie auf Blühpflanzen!**
- ⚠ **Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H411)**
- ⚠ **Gel nicht mit Insektizidsprays kontaminieren – Köder wird unwirksam**
- ⚠ **Gel nicht direkt an Wasserabflüssen aufbringen**

HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN

✗ Falsch	✓ Richtig
Gel mit Insektizid-Spray kombinieren	Spray einstellen – Gel braucht 3–7 Tage Wirkzeit
Grosse Gelmenge auftragen	Kleine Punkte (Reiskorn-Grösse) – Ameisen bevorzugen Frisches
Köder nach 1–2 Tagen entfernen	Mindestens 5–7 Tage warten (Dominoeffekt)
Auf blühende Pflanzen in Nähe auftragen	Abstand zu Blühpflanzen einhalten – Bienenengefahr!

TIPPS FÜR TECHNIKER

- Imidacloprid wirkt systemisch – Ameisen tragen Wirkstoff ins Nest
- Dominoeffekt setzt nach 3–7 Tagen ein – Geduld ist wichtig
- Köder alle 5–7 Tage erneuern bis Befall vollständig beseitigt
- Gel-Tuben mit Kanüle für präzise Platzierung in Fugen verwenden
- Keine Kombination mit Reinigungsmitteln oder Sprays (repellent!)