

## PRODUKTÜBERSICHT

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkttyp          | Rodentizid-Körner (gebrauchsfertig)                      |
| Wirkstoff           | Difenacoum 0,005 % (2. Gen. Antikoagulans)               |
| Wirkung             | Antikoagulans – verhindert Blutgerinnung, letale Wirkung |
| Zulassung           | CH-2014-0033                                             |
| Hersteller/Vertrieb | Liphatech / Paradiﬀusion SA, Versoix                     |

## ZIELSCHÄDLINGE

- Ratten (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*)
- Hausmäuse (*Mus musculus*)

## GEEIGNETE EINSATZORTE

- In gesicherten Köderstationen im Innen- und Aussenbereich
- Entlang von Nagerpfaden, Wänden, Hohlräumen
- Schwer zugängliche Bereiche wo Köderblöcke nicht passen

## VERBOTENE / UNGEEIGNETE EINSATZORTE

- NUR in Köderstationen – NIE offen auf dem Boden auslegen!
- Kein Zugang für Kinder, Haustiere oder Wildtiere
- Nicht in Gewässernähe (H400/H410 – aquatisch giftig!)
- Schwangere Personen dürfen NICHT mit Produkt in Kontakt kommen (H360D)!

## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

- ✓ **Schutzhandschuhe (Nitril/Gummi) – IMMER tragen**
- ✓ **Atemschutz (P1) beim Umfüllen grösserer Mengen**
- ✓ **Hände nach Arbeit gründlich waschen**

## ERSTE HILFE

- Einatmen: Frischluft; bei Symptomen Arzt aufsuchen
- Hautkontakt: Gründlich mit Seife und Wasser waschen
- Augenkontakt: 15 Min. spülen, Arzt aufsuchen
- Verschlucken: SOFORT Arzt! Gegenmittel: Vitamin K1 – Tox Info: 145

## DOSIERUNG / ANWENDUNG

| Ziel        | Menge             | Hinweise                              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| Mäuse       | 30 g/Station      | Alle 3–5 m eine Station               |
| Ratten      | 100–200 g/Station | Alle 5–10 m eine Station              |
| Nachfüllung | Nach Bedarf       | Bei Verbrauch > 50% sofort nachfüllen |

Körner NUR in geschlossenen Köderstationen verwenden. Körner niemals offen auf dem Boden liegen lassen!

## KRITISCHE WARNUNGEN

- ⚠ **REPRODUKTIONSTOXISCH (H360D) – Schwangere dürfen nicht mit dem Produkt in Kontakt kommen!**
- ⚠ **SEHR GIFTIG (H300/H310/H330) – Schutzhandschuhe Pflicht!**
- ⚠ **Sekundärvergiftung für Raubvögel, Raubtiere und Haustiere!**
- ⚠ **Sehr giftig für Wasserorganismen (H400/H410)**

## HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN

| ✗ Falsch                                          | ✓ Richtig                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Körner offen auslegen                             | NUR in Köderstationen – nie ungeschützt auslegen!        |
| Kontakt von Schwangeren mit Produkt oder zulassen | Schwangere sind von diesem Produkt fernzuhalten (H360D)! |
| Station nicht kontrollieren                       | Mind. alle 3–5 Tage kontrollieren und nachfüllen         |
| Kadaver liegen lassen                             | Kadaver täglich mit Handschuhen sammeln und entsorgen    |

## TIPPS FÜR TECHNIKER

- Köderstationen an aktiven Nagerpfaden aufstellen (Losung, Frassspuren, Laufspuren)
- Stationen wetterfest und kindersicher – Schloss oder Schrauben prüfen
- Difenacoum: Wirkungseintritt 4–7 Tage nach Erstaufnahme
- Bei Resistenz Wirkstoff wechseln – Monitoring dokumentieren
- Stationen beschriften mit Datum und Befüllmenge